

CEVAC® NEW L

Vacuna Activa, Liofilizada Cepa La Sota

Para la inmunización activa de pollos contra la
Enfermedad de Newcastle

COMPOSICIÓN

CEVAC® NEW L contiene la cepa lentogénica La Sota del virus de la enfermedad de Newcastle en forma activa y liofilizada. Los huevos embrionados empleados en la elaboración de la vacuna se obtienen de parvadas libres de patógenos específicos (SPF).

INDICACIONES

Para la inmunización activa de pollos sanos contra la enfermedad de Newcastle. La vacuna puede emplearse para la primovacunación o revacunación de pollos, pollitas y gallinas.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

La primovacunación puede realizarse con CEVAC® NEW L por vía ocular a partir del cuarto día de edad.

Se recomienda una revacunación entre tres y cuatro semanas posteriores a la primovacunación, ya sea por vía ocular (gotero x 30 ml para cada 1000 dosis, equivalente a una gota por ave) o a través del agua de bebida (calculando 10 litros de agua por cada 1000 pollitos).

Para pollitas de reemplazo una segunda revacunación es recomendada entre las 10 y 12 semanas de edad.

Para la administración en agua de bebida, previa restricción del agua, se recomienda tratarla con Cevamune, con el fin de eliminar el cloro y garantizar la eficacia de la vacuna.

ALMACENAMIENTO

Almacenar la vacuna entre +2°C y +8°C protegida de la luz.

PRESENTACIÓN

Viales de 5,000 dosis.

PRECAUCIONES

El virus de la enfermedad de Newcastle puede causar una leve inflamación en el ojo de los humanos que puede durar de dos a tres días. Se debe tener cuidado para evitar el contacto con los ojos cuando se maneje el virus.