

FICHA TECNICA**RATIMOR BRODI BLOQUE 20 y 10GR****MATERIAL:**

Cebo rodenticida parafinado en bloque x 10gr y 20gr.

Ingrediente Activo: Brodifacoum 0.005%

PRESENTACIÓN:

El producto esta empacado en B a l d e plástico x 10 kilos y Pote x 1K.

**USO**

Para ser usado en: El producto será usado para control de roedores en Salud Publica e Industrial. La especie atacada es la rata parda (*Rattus norvergicus*), rata negra (*Rattus rattus*) y el ratón domestico (*Mus musculus domesticus*).

Modo de uso El producto es usado como rodenticida en y alrededor de establecimientos como: Hospitales, plantas de proceso, almacenes de alimentos, restaurantes, etc., para exterminar el ratón domestico (*Mus musculus*), la rata negra (*Rattus rattus*) y la rata parda (*Rattus norvergicus*).

DOSIFICACION Y APLICACION

Infestación de ratas: Usar 50g de bloques parafinados. En caso de infestaciones severas, ubicar los puntos de cebo espaciados en 10m. e ir reduciendo a 5m. Una vez ubicado el rodenticida no cambiar o modificar los puntos de cebo por varios días. Si no se ven signos de actividad de roedor cerca de los puntos de cebo por 7 a 10 días, entonces retirar el cebo a un área de mayor actividad.

Infestación de ratones: Usar 15g. de cebo rodenticida. En caso de infestaciones severas, ubicar los puntos de cebo espaciados en 5m. e ir reduciendo a 2m. Los ratones olisquean mucho y el mover los cebos cada 2 o 3 días ayudara al programa de manejo y control de roedores, cuando los puntos de cebo son inspeccionados y/o llenados.

Colocar los cebos rodenticidas donde haya signos de actividad, tales como excrementos frescos, cerca de madrigueras, rutas de paso y fuentes de comida. Usar tantos bloques como sea necesario.

Las dosificaciones son referenciales, recomendamos consultar con nuestro especialista técnico.

DPTO TECNICO PISAPIG'S S.A.