

VECTORMUNE® FP LT

Vacuna vectorizada viva liofilizada.

Para la inmunización activa de
pollos contra la Viruela Aviar y la
Laringotraqueítis Infecciosa Aviar.

Laringotraqueítis Infecciosa & Viruela aviar
VACUNAS VECTORIZADAS

COMPOSICIÓN

VECTORMUNE® FP LT es una vacuna elaborada con un virus de la Viruela Aviar modificado mediante ingeniería genética para emplearse en pollos. El virus de la viruela aviar ha sido genéticamente modificado para expresar antígenos protectivos clave del virus de la Laringotraqueítis aviar (LT). Esta vacuna se presenta en forma liofilizada.

INDICACIONES

VECTORMUNE® FP LT se recomienda para la aplicación mediante punción en el ala de pollos sanos, susceptibles, de ocho semanas de edad o mayores, pero al menos 4 semanas antes de que las aves entren a postura. **VECTORMUNE® FP LT** se recomienda como ayuda en la prevención de la Viruela Aviar y la Laringotraqueítis Infecciosa Aviar. Las aves que vayan a vacunarse no deben haber sido expuestas al virus de campo de la Viruela Aviar o a la vacuna contra la Viruela Aviar debido a la interferencia de la inmunidad después de la vacunación.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Punción alar: Insertar el aplicador en el pliegue del ala evitando las plumas, músculo, hueso y vasos sanguíneos (0.01 mL dosis/ave). La vacuna debe ser consumida totalmente una hora después de habersereconstituido.

ALMACENAMIENTO

Almacenar la vacuna entre +2°C y +8°C protegida de la luz.

PRESENTACIÓN

2000 y 4000 Dosis
Con diluyente y aplicadores (punzones).

(Patent Numbers: U.S. 6312696)



SOLO PARA USO VETERINARIO

