

» Virkon™ LSP

**Desinfectante multiusos
para granjas
De amplio espectro
Basado en fenólicos sintéticos**



**Flexibilidad y actividad de amplio espectro.
Eficaz contra virus, bacterias y hongos en una amplia
gama de temperaturas y en presencia de retos orgánicos.**



Composición

Virkon™ LSP es una mezcla sinérgica de fenólicos sintéticos específicamente diseñada para proporcionar flexibilidad y actividad de amplio espectro eficaz contra virus, bacterias y hongos en un amplio rango de temperaturas y en presencia de materia orgánica.

PROPIEDADES GENERALES

- **Potente desinfectante multiusos de amplio espectro**
- **Versátil - Para desinfección de superficies de granjas, equipos y pediluvios**
- **Efectivo en la presencia de desafíos orgánicos**
- **Efectivo a bajas temperaturas**

Eficacia de amplio espectro comprobada

- Influenza Aviar
- Enfermedad de Newcastle
- Fiebre aftosa
- Virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa (Gumboro)
- Salmonella
- E.coli
- Campylobacter
- Virus de la diarrea epidémica porcina (PEDv)
- Virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS)

Resumen de Datos de Eficacia para Virkon™ LSP

Viruses	Método de prueba	Tasa de dilución	Tiempo de contacto (minutos)
Enfermedad de Newcastle	Protocolo de Reino Unido DEFRA	1:75	30
Enfermedad de Newcastle	Directriz US EPA	1:600	10
Bronquitis infecciosa aviar	Directriz de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.	1:400	10
Influenza Aviar (H3N2)	Directriz US EPA	1:400	10
Influenza Aviar (H5N1)	Directriz US EPA	1:1000	10
Influenza Porcina (H1N1)	Directriz US EPA	1:400	10
Enfermedad vesicular porcina	Protocolo de Reino Unido DEFRA	1:50	30
Virus enfermedad infecciosa de la bolsa	Directriz US EPA	1:50	10
Virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS)	Directriz US EPA	1:600	10
Virus de la diarrea epidémica porcina (PEDv)	Directriz US EPA	1:600	10
Fiebre aftosa	Protocolo de Reino Unido DEFRA	1:1100	30

Bacteria	Método de prueba	Tasa de dilución	Tiempo de contacto (minutos)
Campylobacter jejuni	Método AOAC	1:200	10
Mycobacterium fortuitum	Protocolo de Reino Unido DEFRA para TB	1:15	30
Salmonella enteritidis	Protocolo de Reino Unido DEFRA como recomendación general	1:40	30
Salmonella enterica	Método AOAC	1:400	10
Salmonella enterica serotype typhimurium	Método AOAC	1:200	10
Escherichia coli O157:H7	Método AOAC	1:400	10
Escherichia coli	Método AOAC	1:600	10
Streptococcus suis	Método AOAC	1:200	10
Staphylococcus aureus	Método AOAC	1:400	10
Pseudomonas aeruginosa	Método AOAC	1:400	10
Mycoplasma hyopneumoniae	Método AOAC	1:200	10

Resumen de Datos de Eficacia para Virkon™ LSP

Hongos y levaduras	Método de prueba	Tasa de dilución	Tiempo de contacto (minutos)
Aspergillus niger	Método AOAC	1:200	10
Candida albicans	Método AOAC	1:400	10
Trichophyton mentagrophytes	Método AOAC	1:200	10

Desempeño superior a bajas temperaturas

La capacidad de un desinfectante de trabajar bien a bajas temperaturas contribuye al valor de su uso diario. Está bien establecido que la eficacia de los desinfectantes base glutaraldehído pueden disminuir a medida que la temperatura baja requiriendo que su concentración y tiempo de contacto con la superficie sea incrementada. Por el contrario, Virkon™ LSP mantiene su eficacia contra los patógenos hasta 4° C en la dilución estándar 1:200 sin la necesidad de aumentar la concentración o el tiempo de contacto.

Aplicaciones

Virkon™ LSP es una poderosa formulación concentrada que proporciona flexibilidad y actividad de amplio espectro con eficacia contra virus, bacterias y hongos en una amplia gama de temperaturas y en presencia de desafío orgánico. Estas cualidades hacen de Virkon™ LSP una solución flexible para la desinfección de superficies de la granja, equipos, botas y ruedas de vehículos.

Aplique la solución Virkon™ LSP a las superficies con un rociador de mochila o una lavadora a presión a una tasa de aplicación de 300 ml / m². Permita un tiempo de contacto mínimo de 10 minutos* o use el tiempo de contacto apropiado que se muestra en la tabla de eficacia. Dejar secar. La frecuencia de la aplicación dependerá de los requisitos individuales de bioseguridad de cada sitio.

Para el control de patógenos específicos, la tasa de dilución empleada debe modificarse de acuerdo con los datos que se muestran en la tabla de datos de eficacia. En caso de brotes de enfermedades, la tasa de uso se puede modificar a una dilución de 1: 100 para medidas de bioseguridad de rutina.

En caso de necesitar más ayuda en el control de patógenos específicos o métodos de uso para el producto, por favor, póngase en contacto con LANXESS para más información.



*Para aplicaciones de DEFRA, use un tiempo de contacto de 30 minutos como mínimo.

Instrucciones de uso - Desinfección de superficies y equipos

Si las superficies y los equipos están muy sucios, asegúrese de que se hayan limpiado, enjuagado, secado a fondo con un detergente de trabajo pesado de LANXESS antes de aplicar la solución de Virkon™ LSP.

Para la desinfección de superficies duras, prepare una solución de Virkon™ LSP a una dilución de 1:200 o 1:400, según aplicación, los niveles de suciedad y la temperatura climática. En condiciones de poca suciedad y temperaturas a partir 20°C, aplicar la dilución 1:400. Para cualquier otra condición usar la dilución 1:200.

Aplique la solución Virkon™ LSP a las superficies con un rociador de mochila o una lavadora a presión a una tasa de aplicación de 300 ml / m². Permita un tiempo de contacto mínimo de 10 minutos* o use el tiempo de contacto apropiado que se muestra en la tabla de eficacia. Dejar secar. La frecuencia de la aplicación dependerá de los requisitos individuales de bioseguridad de cada sitio.

Equipos pueden sumergirse en una solución de Virkon™ LSP durante un máximo de 60 minutos.

Desinfectante de Pediluvios

Prepare una solución nueva directamente en el contenedor del pediluvio, a una tasa de dilución de 1: 200, asegurándose de que cualquier solución antigua se elimine adecuadamente antes de comenzar. Reemplace la solución una vez que se haya ensuciado, y de acuerdo con la orientación proporcionada por la política de bioseguridad del sitio.



virkon.com

Precauciones

- No es adecuado para su uso en instalaciones de producción y/o manipulación de lácteos o leche, debido al riesgo de contaminación de la leche.
- Use los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usar.
- Evite el contacto con los ojos y la piel durante la manipulación de este producto.
- No respire la niebla cuando es pulverizado el producto (use un respirador de niebla en todo momento durante el proceso de aplicación).
- Use ropa de protección personal adecuada que incluya; Overoles impermeables, guantes y botas, y protección facial.
- No permita que el producto ingrese a cursos de agua.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Siempre consulte la Hoja de datos de seguridad del material (HSDQ) para obtener detalles sobre la salud y seguridad específicas del producto antes de usarlo.
- Enjuague todo el equipo de aplicación con agua limpia después del uso.

Procedimientos de emergencia / primeros auxilios

- Si el producto o sus diluciones se salpican en el ojo, enjuague inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico.
- Enjuague cualquier residuo de producto que toque la piel inmediatamente con agua.
- Si se ingiere, permita que el paciente tome agua si está consciente, pero no induzca el vómito.
- Busque ayuda médica.



Antec International Limited
LANXESS Material Protection Products
Windham Road, Chilton Industrial Estate,
Sudbury, Suffolk, CO10 2XD
United Kingdom

Tel. +44 (0)1787 377305
biosecurity@lanxess.com
virkon.com
lanxess.com

©2019 LANXESS. Virkon™, LANXESS™, el logotipo de LANXESS y cualquier logotipo asociado son marcas comerciales propiedad de LANXESS Deutschland GmbH o sus filiales. Todas las marcas comerciales están registradas en diferentes países del mundo.

Almacenamiento

Mantener el envase en posición vertical en un lugar seco y fresco alejado de la luz solar directa.

Eliminación

Producto: Eliminar como residuo especial según las disposiciones locales y nacionales. No debe dejarse que el producto penetre en drenajes, cursos de agua ni suelos.

Recipiente: Si no es posible el reciclaje, eliminar según las disposiciones locales y nacionales. No dejar que el enjuague de los equipos de limpieza del material eliminado penetre en las aguas superficiales ni subterráneas. Los recipientes vacíos deben ser llevados a un punto de tratamiento de residuos certificado para su reciclaje o eliminación.

Vida útil

La vida útil del producto concentrado es de 3 años, sin embargo puede variar de acuerdo a las aprobaciones de las autoridades locales. La solución diluida, si almacenada apropiadamente puede ser adecuada para uso hasta por una semana.

Tipos de envases

Disponible en 5, 20 y 200 litros.



Distribuidor:
ICC – International Commerce Company S.A.C.
Dirección: Jr. Grimaldo del Solar 460,
Miraflores, Lima, Peru
Tel: (+51) 447 5348 / (+51) 447 0597